



Aspid®

Insecticid sistemic cu o eficiență înaltă pentru combaterea unui spectru larg de dăunători la măr, rapiță și cartof

Substanța activă:

Tiacloprid 480 gr/l

Forma preparativă:

Suspensie concentrată

Caracteristica substanței active

Tiaclopridul face parte din clasa neonecotinoizi

Spectru de acțiune:

Aspid® combate majoritatea dăunătorilor rapiței inclusiv gândacul lucios al rapiței, gărgărița semințelor de varză; dăunătorii mărului: viermele merelor, molia livezilor, gărgărița bobocilor de măr, gândacul păros; dăunătorii cartofului: gândacul din colorado.

Modul de acțiune:

Tiaclopridul întrerupe transmiterea impulsurilor nervoase. Pătrunde în organismul dăunătorului atât prin contact direct cât și prin ingestie protejează întreaga plantă, datorită acțiunii sistemice, inclusiv organele care nu au nimerit sub tratament.

Viteza de acțiune:

Aspid® acționează foarte rapid, se manifestă deja în prima oră după tratare.

Perioada de acțiune:

în mediu 14-21 zile (până la 30 de zile).

Recomandări de utilizare:

Se recomandă efectuarea tratamentului la rapiță în perioada de vegetație la depășirea pragului economic de dăunare. tratamentele se fac în perioada zilei fără vânt, rouă și ploaie. Se recomandă utilizarea adjuvantului pentru o acoperire uniformă. Tratamentele în cultura de măr și cartof în conformitate cu termenii și recomandările.

Restricții:

Aspid® este un produs cu impact redus asupra entomofaunei benefice. Spre deosebire de alte insecte albinele au capacitatea de a descompune tiaclopridul, până la produși inofensivi, în procesele metabolice sub acțiunile unor fermenți. Toxicitatea redusă a tiaclopridului asupra albinelor a fost demonstrată științific. Cu toate acestea este necesar respectarea cerințelor de utilizare, 3-4 km distanța de zbor a albinelor și perioada de așteptare 48-72 ore.

Compatibilitatea:

Aspid® este compatibil cu majoritatea pesticidelor cu excepția produselor cu reacție alcalina.

Norma de consum a soluției de lucru:

200-400 l/ha

Ambalaj:

flacon 1 l.

Recomandări pentru utilizare:

Cultura	Dăunători	Norma de consum a produsului, l/ha
Rapiță	Gândacul lucios al rapiței, Puricii cruciferelor, Păduchi Gărgărița semințelor de varză	0,2-0,25