



Bunker®

Produs pentru tratarea semințelor cerealiere cu eficacitate înaltă și econom în combaterea infecțiilor din semințe și sol

Substanța activă:

Tebuconazol, 60gr/l

Forma preparativă:

Suspensie concentrată.

Proprietățile produsului:

- Spectru larg de acțiune
- Acțiune sistemică înaltă
- Protecție îndelungată
- Norma de consum redusă
- Forma preparativă high-tech

Spectrul de acțiune:

Malura comună, Tăciune, Septorioza grâului, Tăciunele orzului, Helmitosporioza și Putregaiul fuzarian al rădăcinilor, Mucegaiul semințelor de grâu și orz, Mucegaiul de zăpadă al grâului.

Viteza de acțiune și perioada de protecție:

Asupra infecției seminale acționează deja după 2 - 4 ore după însămânțarea. Asigură o protecție completă împotriva infecției internă și de suprafață a seminței, Eficient împotriva putregaiurilor rădăcinilor (bazală) și infecției frunzelor în fazele inițiale de creștere și dezvoltare plantelor pînă în faza de înfrățire a culturii. Bolile spicului care apar în faze de dezvoltare mai târziu (Mălura și Tăciunea) sun controlate prin tratarea semințelor. Deoarece produsul are eficiență nu doar de protecție dar și de vindecare, este asigurată suprimarea eficientă a infecției chiar și după apariția simptomelor.

Recomandări pentru utilizare:

Tratarea semințelor se face preventiv sau imediat înainte de semănat. Semințele cerealelor de toamnă proaspăt recoltate trebuie prelucrate nu mai târziu de 2 - 5 zile pînă la semănat.

Pentru tratare se recomandă să se folosească semințe curățate de praf și impurități, asigurând astfel o mai bună aderență și calitate a tratării. Calitatea tratamentului se verifică după intensitatea colorației semințelor

Compatibilitatea:

Bunker® asigură o protecție eficientă a semințelor și plantelor proaspăt răsărite de complexul de agenți patogeni. În acest caz, nu necesită consolidarea acțiunii fungicide datorată altor produse. Bunker® este compatibil în amestecurile cu insecticidele Tabu®, * Tabu® Neo.

Norma de consum a soluție de lucru:

Pentru tratarea 1 t de semințe se va utiliza 10 l soluție de lucru.

Ambalaj:

canistră 5 l.

Recomandări pentru utilizare:

Cultura	Obiectul nociv	Norma de consum l/t
Grâu și orz	Mălura comună, tăciunele zburător, putregaiul rădăcinilor, fuzarioza și helmintosporioza	0,4 - 0,5