

Корсар®

Послевсходовый контактный гербицид против многих видов двудольных сорняков, в том числе устойчивых к 2,4-Д и МЦПА, в посевах сои и гороха

Действующее вещество:
бентазон, 480 г/л.

Препаративная форма:
водорастворимый концентрат.
бентазон относится к классу производных тиадиазинов.

Спектр действия:
многие виды двудольных сорных растений, в том числе устойчивых к 2,4-Д и МЦПА.
Высокочувствительны: незабудка полевая, бородавник обыкновенный, горец вьюнковый, горец бледный, горец почечуйный, портулак (виды), редька дикая, лютик полевой, стрелолист (виды), торица полевая, горчица полевая, звездчатка средняя, ярутка полевая, дурнишник (виды), сушеница топяная, монохория Корсакова, канатник Теофраста, щирица запрокинутая, частуха (виды), лебеда (виды), пупавка (виды), капуста полевая, сусак зонтичный, пастушья сумка, василек синий, сыть (виды), дурман обыкновенный, подсолнечник (виды), гибискус тройчатый, подмаренник цепкий, ромашка (виды). Среднечувствительны: амброзия (виды), марь белая, коммелина (виды), вьюнок полевой, дымянка лекарственная, галинсога мелкоцветная, клубнекамыш (виды), крестовник обыкновенный. Слабочувствительны: бодяк полевой, пикульник обыкновенный, яснотка пурпурная, мак-самосейка, вероника (виды), горец птичий.

Механизм действия:
проникает в сорные растения преимущественно через зеленые части, обладает контактным действием.

Скорость воздействия:
видимые признаки угнетения сорняков, в зависимости от погодных условий, проявляются через 1 - 7 дней после применения, а их полная гибель наступает примерно через 10 - 14 дней.

Рекомендации по применению:
обработка Корсаром® оптимальна, когда большинство сорняков находится на ранних стадиях развития (от 2 до 5 настоящих листьев) и активно растет.

Факторы, влияющие на эффективность препарата:
обработку следует проводить в благоприятную для роста растений погоду (от 10 до 25 °С). Прохладная погода замедляет видимое действие препарата.
Наиболее чувствительные культуры (горох) рекомендуется опрыскивать по возможности в пасмурную погоду и при температуре ниже 20 °С (например, поздно вечером или рано утром), принимая во внимание сортовую чувствительность. Не рекомендуется применять препарат, если ожидаются ночные заморозки, а также обрабатывать культуру, испытывающую угнетение вследствие неблагоприятных погодных или иных условий.

Приготовление рабочего раствора:
рабочий раствор готовить непосредственно перед опрыскиванием. Отмерить требуемое количество препарата на одну заправку опрыскивателя. Бак опрыскивателя наполнить примерно на 1/2 водой, влить в него необходимое количество гербицида, долить водой до полного объема при постоянном перемешивании раствора гидравлическими мешалками. При этом несколько раз ополоснуть водой емкость, в которой находился гербицид, остатки препарата вылить в бак опрыскивателя.

Совместимость:
Корсар® совместим в баковых смесях с другими препаратами, за исключением пестицидов, имеющих кислую реакцию. На сое возможны комбинации с граминицидами Квикстеп® и Миура®.

Расход рабочей жидкости: 200 - 300 л/га.

Упаковка: канистры по 5 л; 10 л.

Культура	Норма расхода препарата, л/га	Способ и сроки обработки	Срок ожидания (Кратность обработок)
Соя	2 - 3	Опрыскивание посевов в фазе 1 - 3 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков	60 (1)
Горох (кроме консервного)	2 - 3	Опрыскивание посевов в фазе 3 - 6 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков	