Кумир®

Медьсодержащий фунгицид для использования в интегрированных системах защиты картофеля, томатов, плодовых культур и винограда от болезней

Действующее вещество:
сульфат меди трехосновный, 345 г/л.

Препаративная форма:
суспензионный концентрат.

Преимущества препарата:
- высокая эффективность против основных заболеваний картофеля, томатов, плодовых культур и винограда
- необходимый элемент интегрированных систем защиты культур, дополняющий системные фунгициды
- возможность использования в современных антирезистентных программах
- удобная в применении жидкая препаративная форма

Характеристика действующего вещества:
сульфат меди трехосновный относится к химическому классу препаратов связанной меди и обладает контактным действием.

Спектр действия:
Парша, монилиоз, бактериозы на яблоне, курчавость листьев на персике, бактериозы, клястероспориоз, полистигмоз на сливе, фитофтороз, альтернориоз, бактериальная пятнистость на картофеле и томатах, милдью на винограде

Механизм действия:
препарат проявляет защитное действие, предотвращает прорастание спор патогенов. Для получения максимального эффекта от обработки необходимо проводить ее до начала заражения растений.

Скорость воздействия:
Кумир® начинает действовать сразу же после применения.

Период защитного действия:
7 - 14 дней в зависимости от погодных условий и инфекционной нагрузки. По истечении этого срока необходимо проводить повторную обработку.

Совместимость:
Кумир® совместим с другими пестицидами, кроме препаратов, обладающих сильнокислой или сильнощелочной реакцией. В каждом конкретном случае необходимо проверить смешиваемые компоненты на совместимость и фитотоксичность по отношению к обрабатываемой культуре.

Расход рабочей жидкости:
на картофеле – до 400 л/га, на томатах открытого грунта – 400 - 600, на плодовых и винограде – до 1000 л/га.

Упаковка:
канистры по 10 л.

Культура	Заболевание	Нормарасхода препарата,л/га	Способ и сроки обработки
Картофель, томаты	Фитофтороз, альтернариоз, бактериальная пятнистость	4,0	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7 - 10 дней
Яблоня	Парша, монилиоз, бактериозы	5,0	Опрыскивание в период вегетации: первое – в фазе «зеленый конус», последующие – с интервалом 7 - 10 дней
Слива	Бактериозы, клястероспориоз, полистигмоз	5,0	Опрыскивание в период вегетации
Виноград	Милдью	5-6	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7 - 10 дней