



# Lazurit® Super

**Erbicid sistemic preemergent și postemergent pentru combaterea buruienilor dicotiledonate și monocotilidonate anuale într-o formulare unică lichidă concentrată – nanoemulsie**

## Substanța activă:

metribuzin, 270 g/l.

## Forma preparativă:

Concentrat solubil.

## Spectrul de acțiune:

Dintre buruienile dicotiledonate sunt sensibile la Lazurit® Super astfel de specii ca - ambrozia pelinifolie, albăstrița comună, șopârlită (specii), troscotul (specii), muștarul sălbatic, voinică, curnuții (specii), fumărița medicinală, rocoina, teișorul, măturica, cruculița obișnuită, loboda (specii), spanacul sălbatic (specii), traista-ciobanului, zârna neagră (specii), lungurica (specii), iarba grasă, ridichea sălbatică, știrul (specii), jaleșul anual, urzica moartă, pungulița de câmp etc. Dintre buruienile monocotilidonate sensibile la erbicid sunt - iarba bărboasă, obsiga, coada vulpii, firuța anuală, ovăzul, raigrasul (Lolium rigidum), raigrasul aristat, iarba bărboasă, meșorul roșcat, rogozul (specii), mohorul (specii), meul african. În plus, Lazurit® Super inhibă și unele buruieni perene, cum ar fi păpădia medicinală și susaiul legumicol (din semințe).

## Mecanismul de acțiune:

Este absorbit în buruieni prin frunze, rădăcini și colți. Se deplasează în direcție acropetală, posedă o acțiune sistemică, inhibă procesul de fotosinteză, acționează asupra sistemului de transport al electronilor.

## Viteza de acțiune:

Fiind utilizat înainte de răsărirea culturilor, erbicidul nimicește buruienile în momentul răsării lor, în postemergență - în decurs de 10 - 20 zile după tratament. Erbicidul previne

aparitia celui de-al doilea „val” de buruieni, deoarece împiedică germinarea buruienilor în sol.

## Perioada acțiunii de protecție:

Lazurit® Super protejează culturile de buruieni în decurs de 1 - 2 luni și mai mult (cartoful - practic până la acoperirea cu vrejuri a intervalelor dintre rânduri), în funcție de condițiile meteorologice, tipul de sol și gradul de cultivare a câmpului.

## Pregătirea soluției de lucru:

Deoarece Lazurit® Super este disponibil într-o formă preparativă performantă, nu este necesară pregătirea soluției-mamă! Soluția de lucru se recomandă să se pregătească imediat înainte de stropire. Înainte de pregătirea soluției de lucru erbicidul se va amesteca minuțios în ambalajul de fabricație. Rezervorul pulverizatorului se umple cu apă în proporție de cel puțin 4/5. Cu dispozitivul de amestecare pornit se adaugă cantitatea de erbicid, necesară pentru o alimentare a pulverizatorului. Apoi, amestecând continuu, rezervorul se umple cu apă până face plinul. Recipientul golit se clătește cu apă de câteva ori și conținutul lui se toarnă în rezervorul pulverizatorului. Concentrația maximă a erbicidului în soluția de lucru nu trebuie să depășească 0,5%!

## Compatibilitate:

Pentru mărirea spectrului de acțiune și reducerea normelor de consum, Lazurit® Super poate fi utilizat în amestecuri cu alte produse, în special, cu erbicidul Escudo®.

## Norma de consum a soluției de lucru:

La cartof - 200 - 300 l/ha, tomate răsădite - 500 l/ha, tomate semănate - 300 - 400 l/ha.

## Ambalaj:

canistră 5 l

## Recomandări pentru utilizare:

Cultura	Norma de consum l/ha	Modul și perioada de aplicare	Termenul de așteptare (Numărul de tratamente)
Cartof (soiuri medii și tardive)	0,9 + 0,45	Stropirea buruienilor care vegetează înainte de răsărirea culturii, cu tratamentul ulterior la înălțimea vrejurilor de cartof de 5 cm	60 (2)
	1 - 1,3	Stropirea buruienilor care vegetează la înălțimea vrejurilor de cartof de 5 cm	
Tomate răsădite	1,2 + 1,6	Stropirea buruienilor care vegetează peste 15 - 20 zile după răsărirea răsădului în sol	60 (1)
Tomate semănate	1,1 + 1,4	Stropirea buruienilor care vegetează în faza de 5 - 7 frunze ale culturii	