# Лазурит®

## Системный гербицид против однолетних двудольных и злаковых сорняков на картофеле, томатах, сое и кукурузе

**Действующее вещество:**
метрибузин, 700 г/кг.

**Препаративная форма:**
смачивающийся порошок в водорастворимых пакетах по 0,5 кг.

**Спектр действия:**
однолетние двудольные и злаковые сорняки. Чувствительны: амброзия полыннолистная, василек синий, вероника (виды), галинсога мелкоцветная, горец (виды), горчица полевая, гулявник (виды), дескурайния Софии, дурнишник (виды), дурман обыкновенный, дымянка аптечная, желтушник лакфиольный, жерушник болотный, звездчатка средняя, канатник Теофраста, капуста полевая, кохия веничная, лебеда (виды), лисохвост полевой, марь (виды), мятлик однолетний, одуванчик лекарственный, осот огородный, пастушья сумка, паслен черный, пикульник (виды), портулак огородный, просо куриное, ромашка непахучая, редька дикая, сыть (виды), чистец однолетний, щирица (виды), ярутка полевая и др.

**Механизм действия:**
Лазурит® абсорбируется преимущество корнями сорняков, но может проникать в растение и через листья. Перемещается акропетально.

**Скорость и период защитного действия:**
уничтожает сорняки в момент их прорастания при довсходовом или в течение 10 - 20 суток при послевсходовом применении. Обеспечивает защиту культуры от сорняков на протяжении 1 - 2 месяцев в зависимости от погодных условий и степени окультуренности поля (запаса семян сорных растений в почве, их видового разнообразия).

**Приготовление рабочего раствора:**
рабочий раствор следует готовить непосредственно перед применением. Бак опрыскивателя на 1/4 заполнить водой, при непрерывном перемешивании в него внести отмеренное на одну заправку количество препарата. Бак опрыскивателя продолжить заполнять водой с одновременным перемешиванием рабочего раствора для достижения его однородности. Перемешивание продолжать и во время обработки растений.
Рабочий раствор необходимо использовать непосредственно в день приготовления.

**Совместимость:**
для расширения спектра действия и снижения норм расхода Лазурит® можно применять в баковых смесях с другими пестицидами.

**Расход рабочей жидкости:** 200 - 300 л/га.

**Упаковка:**
коробки по 0,5 кг; коробки по 12 кг, содержащие 4 полиэтиленовые упаковки, в каждой упаковке – 6 водорастворимых пакетов по 0,5 кг.

**Рекомендации по применению:**

| Культура | Норма расхода препарата, кг/га | Способ и сроки обработки | Срок ожидания (Кратность обработок) |
|---|---|---|---|
| Картофель | 0,7 - 1 | Опрыскивание почвы до всходов культуры | – (1) |
| | 0,5 - 0,8 | Опрыскивание культуры при высоте ботвы 5 - 7 см | |
| Томаты рассадные | 0,7 - 1 | Опрыскивание сорняков через 14 - 15 дней после высадки рассады в грунт | |
| Томаты посевные | 0,3 - 0,5 | Опрыскивание растений в фазе 3 - 4 листьев культуры | |
| | 0,5 - 0,7 | Опрыскивание в фазе 5 - 7 листьев культуры | |
| Соя | 0,5 - 0,7 | Опрыскивание почвы до всходов культуры | |
| Кукуруза | 0,8 - 1 | Опрыскивание почвы до всходов культуры с заделкой | |
| | 0,5 + 0,5 | Двукратная обработка: первая – до появления всходов, вторая – в фазе 3 - 4 листьев культуры | – (2) |