Метаксил®

Двухкомпонентный фунгицид для борьбы с болезнями картофеля, томатов, огурцов, винограда и лука



Действующие вещества:

манкоцеб, 640 г/кг и металаксил, 80 г/кг.

Препаративная форма:

смачивающийся порошок в водорастворимых пакетах по 0,5 кг.

Механизм действия:

Метаксил® обладает профилактическим, лечащим и искореняющим контактно-системным действием.

Скорость воздействия:

первое действующее вещество препарата – металаксил – в течение 0,5 - 1 ч после обработки проникает в растение через листья и стебли, перемещается акропетально, способен вылечить растение в случае ранней инфекции и защищает его в дальнейшем. Второе действующее вещество – манкоцеб – усиливает эффект созданием защитного слоя на поверхности листа.

Период защитного действия:

Метаксил® обеспечивает защиту культуры от пероноспоровых грибов в течение 10 - 14 дней с момента обработки в зависимости от инфекционного фона и погодных условий.

Рекомендации по применению:

Метаксил® используют для опрыскивания растений в период вегетации. Первая обработка – профилактическая, последующая – через 10 – 14 дней. Опрыскивать нужно молодые, активно растущие растения, так как по ним препарат передвигается быстрее. Максимальная кратность обработок – 2, на виноградниках последняя обработка – не позднее 14 дней после окончания цветения.

Приготовление рабочей жидкости с использованием ВРП:

рекомендуется готовить непосредственно перед применением препарата. Заполнить бак опрыскивателя на 1/2 водой. При работающей мешалке необходимое количество препарата в нераскрытых водорастворимых пакетах поместить непосредственно в бак опрыскивателя и тщательно перемешать до получения однородной суспензии. Далее при непрерывном перемешивании заполнить бак опрыскивателя водой до полного объема. Перемешивание продолжать и во время обработки растений. Производить вскрытие герметичной упаковки, в которую помещены водорастворимые пакеты. непосредственно перед закладкой в бак опрыскивателя! Не допускать попадания влаги на водорастворимые пакеты! Не рекомендуется приготовление рабочего раствора через бак предварительного растворения (бак-смеситель). Приготовленную рабочую жидкость необходимо использовать в тот же день.

Совместимость:

Метаксил® совместим в баковых смесях с пестицидами, Рабочий раствор должен быть использован в течение нескольких часов после приготовления. Перед применением необходимо проверить смесь на совместимость и фитотоксичность по отношению к обрабатываемой культуре.

Расход рабочей жидкости:

на картофеле – 400 л/га, огурцах открытого грунта – 400 - 600, томатах открытого грунта – 300 - 500, виноградниках – 800 - 1000, луке – 600 - 800 л/га.

Упаковка:

коробки по 1 кг; коробки по 12 кг, содержащие 4 полиэтиленовые упаковки, в каждой упаковке -6 водорастворимых пакетов по 0.5 кг или 3 по 1 кг.

Культура	Заболевание	Норма расхода препарата, кг/га	Срок ожидания (Кратность обработок)
Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	2,5	
Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	2,5	20 (2)
Огурцы	Пероноспороз	2,5	
Томаты	Фитофтороз, альтернариоз	2,5	30 (2)
Виноград	Милдью	2,5 - 3	60 (2)