Миура®

Селективный послевсходовый гербицид для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми сорняками на посевах сельскохозяйственных культур

Действующее вещество:
хизалофоп-П-этил, 125 г/л.

Препаративная форма:
концентрат эмульсии.

Спектр действия:
однолетние злаковые сорняки – лисохвост, метлица, овсюг обыкновенный, просо куриное, канареечник, щетинник сизый, щетинник зеленый, росичка кроваво-красная, плевел, костер, мятлик однолетний, самосевы зерновых. Многолетние злаковые – пырей ползучий, свинорой пальчатый, гумай, полевица белая, мятлик обыкновенный, ветвянка, тростник обыкновенный.

Механизм действия:
обладает системной активностью, очень быстро поглощается листьями и другими надземными частями сорняков и переносится к точкам роста побегов и корневищ. Гербицид нарушает синтез липидов, что приводит к гибели растения. Препарат влияет только на сорняки, встречающиеся в посевах в момент обработки. Он не проникает через почву и не оказывает воздействия на сорные растения, появившиеся после опрыскивания.

Скорость воздействия:
первые симптомы угнетения сорняков появляются через 7 - 10 дней после опрыскивания, а их полная гибель наступает через 1 - 3 недели (в зависимости от вида сорняков и погодных условий).

Симптомы воздействия:
остановка роста надземной массы и корневой системы сорняков, хлороз листьев. Растения вянут, их ткани высыхают, приобретая антоциановую окраску.

Период защитного действия:
при соблюдении технологии выращивания сельскохозяйственных культур Миура® обеспечивает защиту посевов от однолетних злаковых сорняков с момента обработки до конца вегетационного периода.

Приготовление рабочего раствора:
предварительно препарат перемешать в заводской таре. Бак опрыскивателя на 1/2 заполнить чистой водой, включить механизм перемешивания, добавить рассчитанное и отмеренное количество препарата и продолжить заполнение бака опрыскивателя с одновременным перемешиванием до полного объема.

Совместимость:
на посевах свеклы Миуру® можно применять в баковых смесях с противодвудольными гербицидами (Бицепс® гарант, Пилот®), на сое – с Корсаром®.

Расход рабочей жидкости:
200 - 300 л/га. В случае плотной посадки культуры или сильной засоренности посевов норму расхода рабочего раствора следует увеличить.

Упаковка:
канистры по 5 л.

Рекомендации по применению:

Культура	Сорные растения	Норма расхода препарата, л/га	Способ и сроки обработки	Срок ожидания (Кратность обработок)
Рапс	Однолетние злаковые	0,4	Опрыскивание посевов в фазе 2 - 4 листьев сорняков	– (1)
	Многолетние злаковые	0,8	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10 - 15 см	
Подсолнечник	Однолетние злаковые	0,4 - 0,8	Опрыскивание посевов в фазе 2 - 4 листьев сорняков	
	Многолетние злаковые	0,8 - 1,2	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10 - 15 см	
Сахарная свекла	Однолетние злаковые	0,4 - 0,8	Опрыскивание посевов в фазе 2 - 4 листьев сорняков	
	Многолетние злаковые	1	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10 - 15 см	
Соя	Однолетние злаковые	0,4 - 0,8	Опрыскивание посевов в фазе 2 - 4 листьев сорняков	
	Многолетние злаковые	0,8 - 1	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10 - 15 см	