

# Ордан®

Двухкомпонентный фунгицид локальносистемного действия для защиты картофеля, томатов, огурцов и винограда от комплекса болезней

### Действующие вещества:

хлорокись меди, 689 г/кг и цимоксанил, 42 г/кг.

## Препаративная форма:

смачивающийся порошок в водорастворимых пакетах по 0,5 кг.

#### Механизм действия:

благодаря содержанию двух активных компонентов Ордан® обладает профилактическим, лечащим и искореняющим действием. Хлорокись меди (контактный компонент) угнетает ферменты и жизненно важные компоненты клеток фитопатогенных грибов. Цимоксанил (локально-системный компонент) проникает в листья в течение одногочаса и ингибирует биосинтез РНК в клетках патогенов.

#### Скорость воздействия:

цимоксанил быстро абсорбируется и глубоко проникает в листья растений, хлорокись меди остается на листовой поверхности.

#### Период защитного действия:

составляет в среднем 7 - 14 дней в зависимости от степени поражения. Профилактическое действие длится 7 - 14 дней, лечащее – 2 - 4 дня после инфицирования.

#### Особенности препарата:

Ордан® принадлежит к числу наиболее эффективных препаратов против возбудителей болезней, выработавших устойчивость к фунгицидам на основе фениламидов. Он способствует сохранению чувствительности патогенов к фениламидам, не вызывает перекрестной устойчивости к другим препаратам и поэтому с успехом используется в антирезистентных программах. Ордан® обеспечивает более продолжительные интервалы меж-

ду опрыскиваниями по сравнению с обычно применяемыми контактными фунгицидами.

# Приготовление рабочей жидкости с использованием ВРП:

рекомендуется готовить непосредственно перед применением препарата. Заполнить бак опрыскивателя на 1/2 водой. При работающей мешалке необходимое количество препарата в нераскрытых водорастворимых пакетах поместить непосредственно в бак опрыскивателя и тщательно перемешать до получения однородной суспензии. Далее при непрерывном перемешивании заполнить бак опрыскивателя водой до полного объема. Перемешивание продолжать и во время обработки растений.

Производить вскрытие герметичной упаковки, в которую помещены водорастворимые пакеты, непосредственно перед закладкой в бак опрыскивателя! Не допускать попадания влаги на водорастворимые пакеты!

#### Совместимость:

Ордан® можно применять в баковых смесях со всеми пестицидами, кроме препаратов, обладающих сильнокислой или сильнощелочной реакцией.

#### Расход рабочей жидкости:

на картофеле – 400 л/га, на огурцах и томатах открытого грунта – 600, в защищенном грунте – 10 л/100 м2, на виноградниках – 1000 л/га.

#### Упаковка:

коробки по 1 кг; коробки по 12 кг, содержащие 4 полиэтиленовые упаковки, в каждой упаковке -6 водорастворимых пакетов по 0.5 кг или 3 по 1 кг.

#### Рекомендации по применению:

Культура	Заболевание	Норма расхода препарата, кг/га	Срок ожидания (Кратность обработок)
Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	2 - 2,5	20 (2-3)
Огурцы защищенного грунта	Пероноспороз	3	3 (3)
Огурцы открытого грунта		2,5 - 3	14 (3)
Томаты	Фитофтороз, альтернариоз	2,5 - 3	14 (4)
Виноград	Милдью	3	20 (5)