Шарпей®

Инсектицид из класса пиретроидов для защиты многих сельскохозяйственных культур от широкого спектра грызущих и сосущих вредителей

Действующее вещество:
циперметрин, 250 г/л.

Препаративная форма:
микроэмульсия.

Механизм действия:
действует на нервную систему вредителей. Кроме того, способен нарушать откладку яиц у имаго и питание у личинок.

Скорость воздействия:
в течение 10 - 15 мин после обработки вредители перестают передвигаться, а затем в течение 1,5 - 2 ч гибнут в результате общего паралича всех органов.

Период защитного действия:
в зависимости от вида вредителя, стадии его развития и погодных условий составляет от 7 до 14 дней.

Рекомендации по применению:
Шарпей® используют для опрыскивания растений в период вегетации при появлении вредителей. Обработку посевов против вредителей всходов проводят по всходам культур.

Возможность возникновения резистентности:
для предотвращения возникновения устойчивости вредителей рекомендуется чередование с инсектицидами других химических классов.

Ограничения:
препарат высокоопасен для пчел. Запрещается обработка цветущих энтомофильных культур в период активного лёта пчел. Обработку растений следует проводить в утренние и вечерние часы (допустимо проведение днем в пасмурную, прохладную погоду), при скорости ветра до 1 - 2 м/с. Пограничено-защитная зона для пчел не менее 4 - 5 км, ограничение лёта пчел 96 - 120 ч.

Приготовление рабочего раствора:
рабочую жидкость следует готовить непосредственно перед опрыскиванием на специально оборудованных стационарных заправочных узлах. В резервуар заправочного узла залить расчетное количество воды и при включенной мешалке добавить препарат. Приготовленную рабочую жидкость насосами подать в заправочные емкости и доставить к месту проведения обработки. Во время приготовления рабочего раствора и заправки опрыскивателей не допускать пролива рабочей жидкости. При отсутствии средств механизации приготовление рабочих растворов препарата не допускается. Рабочий раствор необходимо использовать в день приготовления. Опрыскиватель после обработки обязательно промыть и высушить.

Совместимость:
Шарпей® совместим в баковых смесях со многими пестицидами, за исключением тех, которые имеют сильнощелочную реакцию.

Расход рабочей жидкости:
для полевых культур по всходам – 100 - 200 л/га, по вегетации – 200 - 400, для садов – 1000 - 1500, для виноградников – 800 - 1200 л/га.

Упаковка:
флаконы по 1 л; канистры по 5 л.

Культура	Вредитель	Норма расхода препарата, л/га	Срок ожидания, (кратность обработок)
Пшеница, ячмень	Клопы, тли, красногрудая пьявица	0,2	25 (1)
Яблоня	Яблонная плодожорка, минирующие моли, тли	0,32	25 (3)
Виноград	Гроздевая листовертка	0,38	25 (2-3)
Кукуруза	Кукурузный стеблевой мотылек	0,2	25 (2)
Горох	Гороховая зерновка	0,2 - 0,3	25 (1)
Свекла сахарная	Совки, свекловичная минирующая моль	0,2 - 0,3	25 (2)