

Сирокко®

Системный инсектоакарицид широкого спектра действия для защиты различных культур

Действующее вещество:
диметоат, 400 г/л.

Препаративная форма:
концентрат эмульсии.

Механизм действия:
препарат обладает высокой системной активностью и контактным действием. В организме вредителей ингибирует холинэстеразу, действуя на нервную систему и вызывая угнетение дыхания и сердечной деятельности.

Скорость и симптомы воздействия:
высокая – на уровне большинства фосфорорганических инсектицидов. Гибель вредных насекомых и их личинок наступает в течение первых 48 ч после применения препарата.

Период защитного действия:
не менее 14 суток.

Рекомендации по применению:
опрыскивание садов проводят в тот момент, когда в посадках появились вредители в количестве, превышающем экономический порог вредоносности. Обработку осуществляют до или после цветения яблони.

Ограничения:
препарат высоко опасен для пчел. Его применение требует соблюдения ряда правил. Обязательно предварительное оповещение местных пчеловодов о проведении обработки, ее сроках и зонах опрыскивания. Запрещается обработка цветущих энтомофильных культур в период активного лёта пчел. Проводить обработку следует в утренние и вечерние часы (допустимо – днем в пасмурную, прохладную погоду, когда пчелы не вылетают из улья), при скорости ветра не более 1 - 2 м/с. Погранично-защитная зона для пчел не менее 4 - 5 км, ограничение лёта пчел не менее 120 - 140 ч.

Приготовление рабочего раствора:
рабочую жидкость следует готовить непосредственно перед опрыскиванием на специально оборудованных стационарных заправочных узлах. В резервуар заправочного узла залить расчетное количество воды и при включенной мешалке добавить препарат. Опрыскиватель после обработки обязательно промыть и высушить.

Совместимость:
Сирокко® совместим с большинством инсектицидов и фунгицидов, кроме препаратов, обладающих щелочной реакцией и серосодержащих. Перед применением необходимо проверить смесь на совместимость. Препарат является идеальным партнером для баковых смесей с пиретроидными инсектицидами (Брейк®, Шарпей®, Сэмпай®). Нельзя смешивать препарат или использовать последовательно с гербицидами на основе сульфонилмочевин, если между применением проходит менее 14 дней, из-за опасности фитотоксичности.

Расход рабочей жидкости:
в садах – 600 - 1500 л/га, на полевых культурах – 200 – 400, винограде – 600 - 1000 л/га.

Упаковка:
флаконы по 1 л; канистры по 10 л.

Культура	Вредитель	Норма расхода препарата, л/га	Срок ожидания (Кратность обработок)
Яблоня	Яблонная плодожорка, минирующие моли, тли	1,9	40 (2)
Слива	Сливовая плодожорка, черный и желтый сливовый пилильщик	1,9	
Абрикос	Восточная плодожорка, зеленая персиковая тля	1,9	
Персик	Восточная плодожорка	1,9	
Виноград	Гроздевая листовертка	1,5-1,9	
Озимая пшеница	Тли, трипсы, клоп вредная черепашка	1,5	30 (1)
Ячмень	Тли, трипсы, клоп вредная черепашка	1,5	
Рапс	Рапсовый цветоед, капустный скрытнохоботник	2	30 (1-2)
Соя	Соевая плодожорка, огнёвка соевая	2	