



# Sirocco®

**Insectoacaricid sistemic cu spectru larg de acțiune pentru protecția diferitor culturi**

## Substanța activă:

dimetoat, 400 g/l.

## Forma preparativă:

Concentrat emulsionabil.

## Mecanismul de acțiune:

Sirocco® are o acțiune sistemică înaltă și un efect de contact. În organismul dăunătorilor inhibă colinesteraza, acționând asupra sistemului nervos și provocând inhibiția respirației și a activității cardiace.

## Viteza și simptomele acțiunii:

Înaltă – la nivelul majorității insecticidelor fosfororganice. Moartea insectelor adulte dăunătoare cît și a larvelor lor are loc timp de 48 ore după tratare.

## Perioada acțiunii de protecție:

cel puțin 14 zile.

## Recomandări pentru utilizare:

Stropirea livezilor se efectuează în momentul când în plantații apar dăunătorii în număr ce depășesc pragul economic de dăunare. Tratamentul se efectuează înainte sau după înflorirea mărului.

## Restricții:

Sirocco® prezintă pericol înalt pentru albi. Aplicarea lui impune respectarea unui șir de reguli. Apicultorii locali trebuie să fie anunțați neapărat în prealabil despre efectuarea tratamentului, termenele lui și zonele de stropire. Este interzis tratamentul culturilor entomofile, care înfloresc în

perioada zborului activ al albinilor. Tratarea plantelor se va efectua dimineața devreme ori seara târziu (se admite ziua pe timp posomorât, răcoros, când albinile nu ies din stup), la o viteză a vântului de până la 1 - 2 m/s. Zona de protecție li-mitrofă pentru albi va constitui cel puțin 4 - 5 km, restricționarea zborului albinilor - cel puțin 120 - 140 ore.

## Pregătirea soluției de lucru:

Soluția de lucru se va pregăti imediat înainte de stropire la unități staționare special echipate de alimentare. În rezervorul unității de alimentare se va turna cantitatea calculată de apă și, cu dispozitivul de amestecare pornit, se va adăuga insecticidul. După tratament e necesar neapărat ca pulverizatorul să fie spălat și uscat.

## Compatibilitate:

Sirocco® este compatibil cu majoritatea insecticidelor și fungicidelor, cu excepția produșelor care posedă o reacție puternic alcalină și conțin sulf. Înainte de aplicare este necesar să se verifice compatibilitatea componentelor amestecului. Sirocco® este un partener ideal pentru amestecurile cu piritozii (Braik®, Șarpei®, Sămpai®). Nu se admite să se amestece Sirocco® ori să se aplice consecutiv cu erbicide pe bază de sulfoniluree, dacă intervalul dintre tratamente este mai mic de 14 zile, altfel există pericolul fitotoxicității.

## Norma de consum a soluției de lucru:

în livezi - 600 - 1500 l/ha, la culturile de câmp - 200 - 400 l/ha, vița de vie - 600 - 1000 l/ha.

## Ambalaj:

flacon 1 l; canistră 10 l.

## Recomandări pentru utilizare:

Cultura	Obiectul nociv	Norma de consum l/ha	Termenul de așteptare (Numărul de tratamente)
Măr	Viermele mărului, molile miniere, păduchi	1,9	40 (2)
Prun	Viermele prunelor, viespea galbenă și neagră a prunelor	1,9	
Cais	Molia orientală a fructelor, păduchele verde al pișicului	1,9	
Piersic	Molia orientală	1,9	
Vița de vie	Molia verde a strugurelui	1,5-1,9	30 (1)
Grâu de toamnă	Păduchi, tripsi, ploșnița cerealelor	1,5	
Orz	Păduchi, tripsi, ploșnița cerealelor	1,5	
Rapiță	Gândacul lucios al rapiței, gărgărița galicolă a varzei	2	30 (1-2)
Soia	Viermele soii, molia păștilor de soia	2	