



Tabu® Neo*

Produs unic cu componență dublă, utilizat la tratarea semintelor pentru combaterea dăunătorilor din sol și de la suprafață

Substanța activă:

Imidacloprid 400 gr/l și Clotianidin 100 gr/l.

Forma preparativă:

Suspensie Concentrată

Prioritățile produsului:

- Protejează eficient cultura de spectrul de dăunători din sol cât și cei de la suprafață în fazele critice – în colțit și răsărire.
- O combinație unică a două substanțe active diferite prin modul de distribuție și dezintegrare în plantă, ceea ce conferă o activitate proporțională în combaterea dăunătorilor cu o perioadă de acțiune îndelungată, în comparație cu produsele concurente.
- Sinergismul acțiunilor substanțelor active conferă un efect rapid și de lungă durată.
- Își păstrează eficacitatea în condiții climatice diferite (gamă largă de temperaturi).
- Eficiența economică prin reducerea numărului de tratamente în combaterea dăunătorilor.

Mecanismul de acțiune:

Clotianidin și imidacloprid sunt insecticide cu acțiune de contact și intestinală, posedă o acțiune sistemică pronunțată. Blochează receptorii nicotinerici ai nervului postsimpatic. În rezultat are loc perturbarea impulsului nervos ce provoacă blocarea totală a transmiterii acestuia, și ca rezultat moartea dăunătorului. Datorită acțiunii sistemice ambele substanțe active pătrund în sămînță apoi în rădăcini iar pe parcurs în toate organele plantei pe măsura dezvoltării lor. Prin redistribuirea treptată a produsului în sistemul plantă sol se menține o concentrație constantă și eficiență în plantă distribuită în părțile vulnerabile, nodul de înfrățire și frunze.

Viteza de acțiune:

După ingestia produsului dăunătorul rămîne imobilizat, este întrerupt procesul de hrănire apoi insecta moare în decurs de 24 de ore.

Perioada de acțiune:

În dependență de norma de consum utilizată și condițiile de vegetație, *Tabu Neo la culturile cerealiere păioase prezintă o eficacitate înaltă pînă în faza de înfrățire uneori pînă în faza de împiere. Pentru semănăturile timpurii se recomandă utilizarea normei maxime de Tabu Neo.

Recomandări de utilizare:

Tratarea semințelor se face preventiv (cu cel mult 1 an înainte) sau imediat înainte de semănat. Pot fi tratate din timp doar semințele condiționate care corespund cerințelor de păstrare. Pentru tratare se recomandă să se folosească seminte curățate de praf și impurități, asigurând astfel o mai bună aderență și calitate a tratării.

Compatibilitate:

*Tabu Neo® poate fi aplicat împreună cu alte produse fungicide pentru tratarea semintelor, este compatibil cu produse precum Vial® TruST, Oplot Trio, TMTD SC în amestec cu care formează o soluție omogenă de culoare roșie fără sedimente. În celelalte cazuri înainte de utilizare este necesar să se verifice compatibilitatea la amestecuri.

Norma de consum a soluției de lucru:

Pentru tratarea semințelor de grâu și orz este necesar 11 l/t

Ambalaj:

canistră 5l

Recomandări pentru utilizare:

Cultura	Obiectul nociv	Norma de consum l/t
Grâu	Gândacul ghebos, puricii cerealelor, muștele cerealelor, păduchi.	0,5-1

*Sunt în stadiu de înregistrare