

Tabu®

Insecticid sistemic pentru tratarea semințelor de grâu și porumb utilizat în combaterea dăunătorilor semănăturilor



Substanța activă:

imidacloprid, 500 g/l.

Forma preparativă:

suspensie concentrată.

Mecanismul de acțiune:

Imidacloprid se caracterizează printr-un efect acut contacto - intestinal asupra dăunătorilor.

Tabu® posedă o acțiune sistemică pronunțată, pătrunde prin rădăcini în germeni și plantulele tinere, protejându-le în perioada cea mai vulnerabilă. El are o acțiune puternică asupra sistemului nervos al insectelor dăunătoare, blocând receptorii nicotinerfici ai nervului postsinaptic.

Viteza de acțiune:

Tabu® suprimă rapid transmiterea semnalelor prin sistemul nervos central al insectelor, astfel ei pierd, mai întâi, activitatea motrică, încetează a se mai hrăni, iar mai apoi pier în decurs de 24 de ore.

Perioada acțiunii de protecție:

Dacă se respectă recomandările de utilizare a insecticidului, se asigură o protecție totală a răsării plantelor de cultură până în faza de 2-3 perechi de frunze adevărate.

Recomandări pentru utilizare:

Tratamentul semințelor se efectuează cu umectarea lor. Pentru tratare se recomandă folosirea semințelor curățate de praș și impurități, fapt, care asigură o bună aderență și

o calitate mai înaltă a tratării. Calitatea tratării se verifică după intensitatea colorării semințelor cu colorant, ce face parte din componența formei preparative.

Important!

Dacă semănăturile de cereale sunt atacate de un număr mare de dăunători, gândacul ghebos și de muștele cerealelor (suedeză, neagră, a grîului), cel mai eficient e să se utilizeze norma de consum maxim admisibil de Tabu®* (0,6 - 0,8 l/t).

Pregătirea soluției de lucru:

Rezervorul mașinii de tratare se va umple cu apă pe 1/3 din volum, se va conecta dispozitivul de amestecare, se va turna cantitatea calculată de Tabu® și se va adăuga apă în rezervor până la volumul necesar. În procesul tratării soluția se va amesteca continuu. Soluția de lucru se va utiliza în decurs de 24 de ore.

Compatibilitate:

Tabu® poate fi aplicat împreună cu alte produse fungicide pentru tratarea semințelor, de exemplu, Vial® TruST, Oplod Trio, TMTD SC ș.a. În celelalte cazuri înainte de utilizare este necesar să se verifice compatibilitatea la amestecuri.

Norma de consum a soluției de lucru:

până la 10 l/t.

Ambalaj

flacon 1l; canistră 5 l.

Recomandări pentru utilizare:

Cultura	Obiectul nociv	Norma de consum l/t
Porumb	Sîrmari și pseudosărmari	6
Grâu	Gîndacul ghebos, gîndacii pocnitori	0,5