

TMTD SC

Fungicid de contact pentru tratarea semințelor multor culturi agricole



Substanța activă:

tiram, 400 g/l.

Forma preparativă:

suspensie concentrată.

Mecanismul de acțiune:

TMTD SC dereglează dezvoltarea organelor vegetative și generative ale ciupercilor patogeni, aflați pe suprafața semințelor.

Viteza de acțiune:

Infecția de pe suprafața semințelor și din sol (mălura comună, mucegaiul semințelor, fuzariozele, helmintosporiozele, rizoctoniozele) este inhibată în decurs de 1 - 2 zile după tratament.

Perioada acțiunii de protecție:

TMTD SC acționează eficient împotriva infecției externe a semințelor și putregaiul (coletului) rădăcinilor, care se dezvoltă în primele faze de dezvoltare a plantelor. Bolile organelor reproductive, ce se dezvoltă la etape mai tardive de creștere a plantelor, sunt nimicite în faza tratamentului semințelor.

Recomandări pentru utilizare:

TMTD SC este utilizat pentru tratarea semințelor preventiv sau imediat înainte de semănat. Calitatea tratării se verifică după intensitatea colorării semințelor cu colorant, ce face

parte din componența produsului. Pot fi tratate semințele condiționate, curățate de praf și impurități, fapt, care asigură o bună aderență și, prin urmare, o calitate mai înaltă a tratării.

Pregătirea soluției de lucru:

Soluția de lucru se va pregăti imediat înainte de tratare. TMTD se va amesteca bine în ambalajul de fabricație. Cantitatea necesară de produs se va amesteca cu apă într-un recipient aparte, adăugând produsul de tratare în apă în proporție de 1:1.

Rezervorul mașinii de tratare se va umple cu apă pe 1/3 din volum și, prin amestec continuu, se va turna soluția-mamă. Ambalajul golit de produs se va clăti cu apă de câteva ori, turnând conținutul în rezervorul mașinii cu soluția de lucru. Apoi prin amestec continuu, rezervorul se va umple cu apă și amestecând bine până la obținerea unei suspensii omogene. Amestecarea se va continua și în timpul tratării semințelor. Soluția de lucru trebuie de utilizat în ziua pregătirii.

Compatibilitate:

TMTD SC este compatibil cu majoritatea produselor fungicide și insecticide pentru tratarea semințelor, cu excepția produselor cu o reacție puternic alcalină sau puternic acidă. Compatibil cu insecticidul pentru tratarea semințelor Tabu, *Tabu® Neo.

Ambalaj

canistră 10 l.

Recomandări pentru utilizare:

| Cultura | Obiectul nociv | Norma de consum, l/t | |
|------------------|--|----------------------|--------|
| | | TMTD SC | apă |
| Grâu, orz | Mălura comună, mucegaiul de zăpadă, putregaiul rădăcinilor, helmintosporioza și fusarioza. | 3,5 | 8 - 10 |
| Mazăre | Mucegaiul semințelor, putregaiul rădăcinilor, fusarioza. | 4 - 6 | 5 - 10 |
| Floarea-soarelui | Putregaiul alb | 4 | 8 - 10 |
| Porumb | Mucegaiul semințelor, putregaiul rădăcinilor și tulpinilor | 2,5 - 3 | 8 - 10 |
| Sfecla de zahăr | Putregaiul rădăcinuțelor, fomoza | 8 - 10 | 15 |