

ТМТД ВСК

**Контактный фунгицидный протравитель
семян многих сельскохозяйственных культур**



Действующее вещество:

тирам, 400 г/л.

Препаративная форма:

водно-суспензионный концентрат.

Механизм действия:

ТМТД ВСК нарушает развитие вегетативных и генеративных органов грибов-возбудителей болезней, находящихся на поверхности семян.

Скорость воздействия:

наружную семенную и почвенную инфекцию (твердая головня, плесневение семян, фузариозы, гельминтоспориозы, ризоктониозы) подавляет в течение 1 - 2 суток после обработки.

Период защитного действия:

препарат достаточно эффективен против наружной семенной инфекции и корневых (прикорневых) гнилей, развивающихся на начальных фазах развития растений. Болезни репродуктивных органов, развивающиеся на более поздних этапах развития растений, уничтожаются при обработке семян.

Рекомендации по применению:

ТМТД ВСК используют для протравливания семян заблаговременно или непосредственно перед посевом. Качество протравливания контролируют по интенсивности окраски семян красителем, входящим в состав препарата. Для протравливания рекомендуется использовать очищенные от пыли и примесей семена, что обеспечивает хорошую прилипаемость и, следовательно, лучшее качество протравливания.

Приготовление рабочего раствора:

рабочую жидкость следует готовить непосредственно перед применением препарата. Перемешать препарат в заводской упаковке. Требуемое количество препарата смешать с водой в отдельной емкости, добавляя протравитель в воду в соотношении 1:1.

Бак протравочной машины на 1/3 наполнить водой и при непрерывном перемешивании влить в него приготовленный маточный раствор препарата. Емкость, содержащую маточный раствор, несколько раз ополоснуть водой, выливая содержимое в бак протравочной машины. Тару из-под препарата необходимо трижды прополоскать водой и содержимое вылить в бак с рабочим раствором. Далее при непрерывном перемешивании заполнить бак водой до полного объема и тщательно перемешать до получения однородной суспензии. Перемешивание продолжать и во время обработки семян. Рабочую жидкость необходимо использовать в день приготовления.

Совместимость:

препарат совместим с большинством фунгицидных и инсектицидных протравителей, кроме препаратов, обладающих сильнощелочной или сильнокислой реакцией.

Совместим с инсектицидным протравителем Табу®, *Табу® Нео.

Упаковка:

канистры по 10 л.

Культура	Заболевание	Норма расхода, л/т	
		препарата	воды
Пшеница, ячмень	Твердая головня, снежная плесень, гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили	3,5	8 - 10
Горох	Плесневение семян, фузариозные корневые гнили	4 - 6	5 - 10
Подсолнечник	Белая гниль	4	8 - 10
Кукуруза	Плесневение семян, корневые и стеблевые гнили	2,5 - 3	8 - 10
Сахарная свекла	Корнеед, фомоз	8 - 10	15