

Protecția culturilor cerealiere



Schema de protecția a culturilor cerealiere		12-13	21	25	29	30	31	32	37	51-59	61-69	71	75-86	91
Obiectul nociv	Înărite de semănat	Începutul înfrățirii	Mijlocul înfrățirii	Sfârșitul înfrățirii	Împălăre	Primul internod	Al doilea internod	Frunză standard	Înspăcare	Înflorire	Coacere în lapte	Coacere în ceață	Maturitate fiziologică	
Gândacul ghebos, viermii sîmîmă.	Tabu®, 0,5 l/t													
Gîndacul ghebos, viermii sîmîmă, muștele cerealelor, păduchi	Tabu Neo 0,5-1,0 l/t													
Malura comună, țacunele zburător, putregaiurile rădăcinilor.	Vial® Trust, 0,4 - 0,5 l/t													
Malura comună, țacunele zburător, mușgai de zăpadă, putregaiurile rădăcinilor	Oploa Trio 0,4-0,6 l/t													
Maluri, Mușgai de zăpadă, Putregaiurile rădăcinilor	TMTD VSK, 3,5 l/t													
Toate tipurile de buruieni dicotiledonate și monocotiledonate (tratament după recolțarea premeregătorului)	Tornado® 500, 3 - 4 l/ha													
Gîndacul ghebos al cerealelor, ploșnița asiatică a cerealelor, tripsul grăului, gîndacul, ovăzului, păduchi.			Boreti®, 0,25 l/ha, Tanrek®, 0,2 - 0,25 l/ha											
Specii de susai, mușgii, trosot, pălămidă, hîrșca urcătoare			Lontrel 300, 0,2 - 0,3 l/ha											
Volbură, hîrșca urcătoare, tunța							Demetra 0,3-0,5							
Buruieni dicotiledonate anuale și unele perene, inclusiv specii de susai și alte specii de buruieni.							Belerna®, 0,3 - 0,5 l/ha							
Buruieni dicotiledonate anuale și perene, inclusiv rezistente la 2,4-D și MCPA							Bomba®, 2,5 - 30 g/ha, Plugger®, 1,5 - 20 g/ha							
Făinare, rugina brună, septorioză														
Făinare, rugină, septorioză, fuzarioză, helmintosporioză														
Ploșnița cerealelor, trips, păduchi, gîndacul ovăzului, căbrăbuleii cerealelor														

*Sunt în stadiu de înregistrare

Boreti®, 0,15 - 0,25 l/ha, Brak®, 0,1 l/ha, Tanrek®, 0,15 l/ha, Sampa®, 0,25 - 0,3 l/ha, Sirocco®, 1,5 l/ha, Șarpei®, 0,2 l/ha